

## INFLUENZA (GRIPE)

**Recomendações:** crianças a partir dos 6 meses.

Principalmente em crianças imunodeprimidas, com doenças crónicas ou com internamento prolongado.

Época de vacinação de outubro até março.

Vacinação anual (vacinação anterior não garante proteção).

**Vacina disponível:**

\* *Influvac*®: 5,84€/dose

\* *Vaxigrip*®: 8,81€/dose

Até aos 8 anos (inclusive): 2 doses, (intervalo de, pelo menos, 4 semanas).

A partir dos 8 anos: 1 dose.



**No caso de dúvidas,  
contacte o seu médico ou  
enfermeiro de família!**

### Bibliografia

- Recomendações sobre Vacinas Extra Programa Nacional de Vacinação 2020, Comissão de Vacinas da SIP-SPP.
- Prontuário terapêutico online.

### Fonte de imagens

- Guia Prático de Saúde, SemFYC, Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, tradução e adaptação julho de 2013.



**Autor:** Dr.<sup>a</sup> Isabel Pinto (Interna da Formação Geral); Dr.<sup>a</sup> Fátima Costa

**Data de realização:** 03/2023 | **Data de revisão:** 03/2024

**Aprovação em Conselho Geral:** 12/04/2023



# Vacinação Extra Plano Nacional de Vacinação



**USF Vale de Cambra**

Rua do Hospital 3730-250 Vale de Cambra  
Telefone: 256 423 666

Email: [usf.valecambra@arsnorte.min-saude.pt](mailto:usf.valecambra@arsnorte.min-saude.pt)

## MENINGITE ACWY

Proteção contra a doença invasiva meningocócica causada pela *Neisseria meningitidis* dos grupos A, C, W e Y.

**Recomendações:** viajantes com estadias prolongadas ou residentes em países com doença hiperendémica ou epidémica.

A administração de uma dose aos 12 meses de idade, dispensa a administração da vacina conjugada contra o grupo C incluída no PNV.

### Vacinas disponíveis:

\* *Nimenrix*®: 48,21€/dose

Idade	Esquema
>6 semanas e <12 meses	2 doses (2 meses intervalo)
A partir dos 12 meses	1 dose

\* *Menveo*®: 48,21€/dose

A partir dos 2 anos: 1 dose.



## ROTAVÍRUS

Vacinação incluída no PNV para crianças pertencentes a grupos de risco (pré-termo, de baixo peso e portadoras de doenças graves, diagnosticadas à data do início da vacinação).

**Recomendações:** crianças não pertencentes aos grupos de risco.

**Contraindicações para a primeira administração:** diagnóstico ou suspeita de imunodeficiência; mãe com tratamento imunossupressor biológico durante a gravidez; história de invaginação intestinal ou malformação que possa predispor a invaginação intestinal.

### 2 vacinas orais disponíveis:

\* *Rotarix*®: 59,52€/dose

2 doses: aos 2 e 4 meses de idade (esquema recomendado).

Pode ser administrada a partir das 6 semanas, com intervalo mínimo entre doses de 4 semanas. Idade da primeira dose deve ser antes das 16 semanas e o esquema deve estar concluído pelas 24 semanas.

\* *Rotateq*®: 50,12€/dose

3 doses: aos 2, 4 e 6 meses de idade (esquema recomendado).

Pode ser administrada a partir das 6 semanas, com intervalo mínimo entre doses de 4 semanas. Idade da primeira dose nunca deve ultrapassar as 12 semanas e o esquema deve estar concluído preferencialmente às 20-22 semanas.

## VARICELA

**Não** está recomendada a administração em crianças saudáveis, de acordo com as orientações da OMS.

**Recomendações:** adolescentes sem história prévia de varicela ou crianças que contactam habitualmente com doentes imunodeprimidos.

### Vacinas disponíveis:

\* *Varilrix*®: 41,99€/dose

2 doses, via de administração subcutânea.

**Idade da primeira dose:** ≥12 meses

\* *Varivax*®: 46,27€/dose

2 doses, via de administração subcutânea ou intramuscular.

**Idade da primeira dose:** ≥12 meses; em circunstâncias especiais (ex. surtos) pode ser administrado a lactentes >9 meses

